

Smärta, smärtbehandling & anestesi, barn & ungdomar

*Stefan Lundeberg
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm*




Smärtbehandlingsenheten Astrid Lindgrens Barnsjukhus

5 smärtläkare

5 smärtsjuksköterskor


alla med anestesi som specialitet



Pre-operativ oro är associerat till mer post-operativ smärta, sömnstörningar och liknande problem

Preoperative anxiety, postoperative pain, and behavioral recovery in young children undergoing surgery.

Kain, Mayes, Caldwell-Andrews, et al. *Pediatrics*. 2006



Chronic pain after surgery in children.

Nikolajsen L¹, Brix LD. *Curr Opin Anaesthesiol*. 2014



"Moderna" anestesimedel

kortverkande - ställer krav på genomtänkt analgesi !

utmaningar

agitation (inhalationsanestetika)

hyperalgesi (remifentanil, inhalationsanestetika)

Emergence delirium / post anestesi agitation

bidragande faktorer

smärta


ålder

premedicinering

induktionsmedel

inhalationsmedel

anestesitid



Sevofluran/Desfluran - agitation

åtgärd

- kortvarigt tillstånd

- bryta orostillstånd

propofol

thiopenthal

- smärtlindra




ALF ENTANIL



Snabbverkande opioid med kort duration

- intubation
- TIVA
- genombrottssmärta anestesiavslut
- procedursmärta

Balanserad anestesi

anestesi och analgesi innan kirurgi





Behov av underhåll med inhalationsanestetika och opioider

kan reduceras med

- 25-50 % med alfa-2 agonister och kortikosteroider som premedicinering eller efter induktion
- med aktivering av blockader före kirurgstart



Basterapi akut smärta

Regionalanestesi

+

Paracetamol intravenöst



Cox-hämmare (NSAIDs)

Klonidin



Opioider

S-ketamin



CONCLUSION:

Among infants undergoing major surgery, postoperative use of intermittent intravenous paracetamol compared with continuous morphine resulted in a lower cumulative morphine dose over 48 hours.

Effect of intravenous paracetamol on postoperative morphine requirements in neonates and infants undergoing major noncardiac surgery: a randomized controlled trial.

Ceelie I, de Wildt SN, van Dijk M, et al. JAMA. 2013

**Cox-hämmare**

Icke selektiv

ibuprofen
diklofenak
ketolorak (iv)


COX-2 selektiv

celecoxib
parecoxib (iv)



Betametason/dexametason per op.

alfa-2 agonister (klonidin, dexmedetomidin)



alfa-2 agonister


klonidin Catapresan®

påverkar smärtransmissionen
inom CNS

vid nociceptiv och neurogen smärta

minskar opioidbehov

intravenöst → per oralt



inte till hjärtrytmrubbningar AV block

opioider

morfín
ketobemidon
oxikodon



titrera efter individens behov, långsam intravenös tillförsel

fentanyl
alfentanil
sufentanil

procedur iv, genombrottssmärta
procedur nasalt

remifentanyl

hyperalgesiproblematik

metadon

Metadon opioid med en “rich pharmacology”

opioid med μ -receptor effekt

icke opioid effekt

- NMDA blockerande effekt
- monoamino-återupptagshämmare
- sannolikt flera okända effekter

Coanalgesic in adult palliative care patients in a low-dose with good clinical analgesic effect

1.Wallace et al. Addition of Methadone to Another Opioid in the Management of Moderate to Severe Cancer Pain: A Case Series. *Journal of Palliative Medicine* 2013
2.Courtemanche et al. Methadone as a Coanalgesic for Palliative Care Cancer Patients. *Journal of Palliative Medicine* 2016
3.Fürst et al. Improved Pain Control in Terminally Ill Cancer Patients by Introducing Low-Dose Oral Methadone in Addition to Ongoing Opioid Treatment. *Journal of Palliative Medicine* 2018

Låg-dos metadon – the way we use it

dosering av metadon 0.1 mg/kg x 2-3 gånger/dygn

till neonatala och spädbarn, ges en reducerad dos



peroperativt vid större kirurgiska ingrepp


EKG screening utförs inte rutinmässigt vid användning
låg-dos metadon



Sedering av barn vid procedurer
aldrig utan smärtlindring vid smärtsamma ingrepp







snabb effekt

kort duration

analgesi


sedativ

>3 - 4 års ålder

Lustgas som metod

- analgetika
- distraktion & lugn miljö
- patient kontroll
- titrering 20-50 % eller fast blandning 50 %
- “fungerande” behandlande läkare på plats

Lustgas i kombination med andra analgetika ur säkerhetssynvinkel



ADHD

Klonidin i hög dos
(5 µg/kg)
+
Sufenta nasalt (1-1,5 µg/kg)

HYPERFOKUSERADE
TÄNKER UTÅFÖR BOXEN
OBEROende
PASSIONERADE
UNIKA
KREATIVA
BANBRYTANDE
PÄHITTIGA POSITIVA SENSITIVA
ENTUSIASТИSKA
SNABBTÄNKNA
ROLIGA
MRSHYPER.SE

Autism

Stesolid 0,3 mg/kg
p o
+
Oxynorm 0,2-0,3
mg/kg p o

Stesolid 0,3 mg/kg per
os (rektalt?)
+

Sufenta nasalt, dos
beroende på effekt och
lokal...

AUTISM

SHOWING THE WORLD HOW BEAUTIFUL, DIFFERENT CAN BE
SPECIELLA PERSONER SOM VÄLJER PERSONER SOM DE ÄR
INTE VÄLKOMNA EX: EN VÄLDIG PERSON SOM HAR LÖV
ÄRLIGA UNDERBARA
ÖVERRASKAN
RÄTTVISAT
PROBLEMOSA INTRESSANTA
KORREKTA UNDERRÄTTLIGA
FÖLJER REGELN
PLANSCHER
NOGGRANNA
LEVER I NUET
TRYCK IN OM DU VÄNTAR PÅ MIG
WHY FIT IN WHEN YOU WERE BORN TO STAND OUT



“the knowing doing gap”

Norsk Barnesmærtforening

OM OSS ▾ VÄRSEMINAR ▾ PROJEKTMÖDOR ▾ FAGSTOFF ▾

Läkemedel till barn

www.koble.info

www.eped.se

RIKTUNJER
FÖR SMÄRTBEHANDLING VID
ASTRID LINDGREN S BARN SJUKHUS

smärтbehandlingsheten för barn

Pediatrik anestesi och intensivvård
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset

VÄLKOMNA TILL
SVENSK BARNSMÄRTFÖRENING

Medlem ▾ Om ▾ Kontakt ▾ Utbildningskurs ▾ Webbutik ▾

